

Quelques remarques sur le champ des courbes hyperelliptiques lisses en caractéristique deux

José Bertin

Institut Fourier
Université de Grenoble 1, 100 rue des Maths, Saint-Martin d'hères F

Jose.Bertin@ujf-grenoble.fr

Abstract

In this note we describe the stack $\mathcal{H}_g$ of smooth hyperelliptic curves of genus g over an algebraically closed field of characteristic two, as a quotient stack of a smooth variety of dimension $3g + 5$ by a non reductive algebraic group, extending a well known result of Vistoli. As an application, we show the Mumford-Vistoli description of the Picard group of the stack $\mathcal{H}_g$ is valid in this characteristic. We also describe the natural stratification of $\mathcal{H}_g$ by means of higher ramification data. We point out that after stable compactification $\overline{\mathcal{H}}_g$ is not smooth in codimension at least two.

Contents

1	Introduction	2
2	Quelques calculs de Torseurs	3
2.1	Objets de marque locale donnée	3
2.2	Le champ classifiant $\mathbf{BG}$	4
3	Courbes hyperelliptiques en caractéristique deux	8
3.1	Le champ $\mathcal{H}_g$	8
3.2	Forme de Rosenhaim généralisée	11
4	La stratification de Hasse du champ $\mathcal{H}_g$	17
4.1	$\mathcal{H}_g$ comme champ quotient	17
4.2	La stratification de Hasse	19
5	Le groupe de Picard de $\mathcal{H}_g$	21

1 Introduction

Dans cette note, on souhaite mettre en évidence quelques propriétés du champ des courbes hyperelliptiques en caractéristique deux, naturellement liées à la spécificité de cette caractéristique. Ces remarques sont toutes en relation avec le caractère Artin-Schreier du quotient par l'involution hyperelliptique. Notons qu'en genre un et caractéristique deux, les points d'ordre deux d'une courbe elliptique se réduisent à un ou deux, et que sous les mêmes conditions, en genre $g = 2$, les points de Weierstrass se réduisent à 3, 2 ou 1. Rappelons que pour le genre deux, Igusa [I] a décrit d'une part l'espace des modules grossiers M_2 sur $\mathbb{Z}$, et d'autre part mis en évidence les particularités liées à la caractéristique deux (forme de Rosenhaim généralisée, automorphismes). Par exemple, les courbes de genre deux se répartissent en trois familles, décrites par une équation non homogène de la forme Artin-Schreier:

$$Y^2 - Y = \begin{cases} \alpha X + \beta X^{-1} + \gamma(X - 1)^{-1} & (\alpha, \beta, \gamma \neq 0) \\ X^3 + \alpha X + \beta X^{-1} & (\beta \neq 0) \\ X^5 + \alpha X^3. \end{cases} \quad (1.1)$$

Le premier résultat de cette note est une description du champ $\mathcal{H}_g$ sur $\overline{\mathbb{F}}_2$ comme champ quotient, résultat qui est enrichi par le fait que $\mathcal{H}_g$ est pour cette caractéristique naturellement stratifié au moyen du conducteur de Hasse, c'est à dire de la ramification supérieure. Si $g = 2$, c'est la stratification de Igusa. On notera cependant que $\mathcal{H}_1 \neq$

$\mathcal{M}_{1,1}$ (voir Remarque 4.3). En caractéristique $p \geq 0$, $p \neq 2$, il est bien connu que si $g = 1$ [M], ou $g = 2$ [V]

$$\mathrm{Pic}(\mathcal{H}_g) = \begin{cases} \frac{\mathbb{Z}}{12\mathbb{Z}}, & \text{si } g = 1 \\ \frac{\mathbb{Z}}{10\mathbb{Z}}, & \text{si } g = 2. \end{cases} \quad (1.2)$$

On notera aussi que si $g = 1$, et bien que les champs soient distincts, on a l'égalité $\mathrm{Pic}(\mathcal{H}_1) = \mathrm{Pic}(\mathcal{M}_{1,1})$ (Remarque 4.3). La détermination de $\mathrm{Pic}(\mathcal{H}_g)$ a été étendue à un genre arbitraire, et caractéristique $p \neq 2$, par Arsie et Vistoli [AV]; de manière un peu plus générale ils considèrent des revêtements à groupe de Galois cyclique et diagonalisable (appelés par ces auteurs revêtements cycliques simples).

Le second résultat de cette note est la description de $\mathrm{Pic}(\mathcal{H}_g)$ si $g \geq 1$, et toujours sur $\overline{\mathbb{F}}_2$. Il découle facilement de la description du champ $\mathcal{H}_g$ comme champ quotient $[X/G]$, où X est un ouvert d'un espace de représentation de G , comme cela a été remarqué par Vistoli [AV],[V], . La différence dans notre cas venant principalement du fait que pour le groupe de Galois $\frac{\mathbb{Z}}{2\mathbb{Z}} \neq \mu_2$, les revêtements sont maintenant du type Artin-Schreier au lieu du type Kummer. La description obtenue peut être vue comme une variation sur le thème des coefficients $a_0, a_1, \dots, a_6$ de la forme de Weierstrass généralisée en caractéristique deux [SI]. On remarquera toutefois que $\mathcal{H}_g$ est encore un champ lisse, fait exceptionnel, non partagé en général par les champs de revêtements en caractéristique positive [BM], [RO]. Il est remarquable que l'on puisse de cette manière retrouver ce fait qui relève essentiellement d'arguments de déformations équivariantes. On remarquera cependant que la compactification stable $\overline{\mathcal{H}}_g$ bien que lisse en codimension un n'est pas lisse en codimension au moins deux si $g \geq 3$.

On peut imaginer qu'une description analogue en caractéristique p du champ de Hurwitz classifiant les revêtements p -cycliques de $\mathbb{P}^1$ comme champ quotient, devrait conduire à des informations précises sur la nature de ses singularités [BM]. Dans tout le texte, et sauf mention du contraire, un corps k est algébriquement clos de caractéristique deux.

2 Quelques calculs de Torseurs

2.1 Objets de marque locale donnée

Dans cette section on rassemble des résultats pour la plupart bien connus, mais dans une formulation commode pour la suite. De manière générale, on sait que la classification des objets au dessus de la catégorie des k -schémas (k corps, ou anneau de base), localement fpqc d'une marque *donnée* (confer. Demazure-Gabriel [DG], Ch III, 5), est équivalente à la donnée du champ classifiant $\mathbf{BG}$, avec pour groupe structural G le groupe des automorphismes de l'objet marque.

Une définition précise et plus générale est comme suit. Soit $\mathcal{M}$ un champ algébrique au dessus de k , i.e. au-dessus de la catégorie des k -schémas. Soit X un k -schéma, et soit $P \in \mathcal{M}(X)$ un objet distingué, l'objet *marque*. Disons que $Q \in \mathcal{M}(U)$ est de *marque* P , s'il y a un morphisme $\alpha : U \rightarrow X$, un recouvrement (étale) $U' \rightarrow U$, tels que

$$Q \times_U U' \cong P \times_X U', \quad \text{donc si} \quad \text{Isom}(Q, P \times_X U)(U') \neq \emptyset \quad (2.1)$$

On définit un champ $\mathcal{M}_P$ (le champ des objets de marque P), dont les objets au-dessus de U sont les couples $(Q, \alpha : U \rightarrow X)$, comme définis au-dessus, cette définition traduisant le fait que Q est de marque P . Un morphisme $(Q, \alpha) \rightarrow (Q', \alpha')$ est un morphisme $f : Q \rightarrow Q'$ au-dessus de $u : U \rightarrow U'$, avec $\alpha' u = \alpha$. Ce champ n'est en fait comme on va le voir qu'une présentation différente du champ classifiant $\mathbf{B}(G/X)$, où $G = \text{Aut}_X(P)$ est le X -groupe algébrique des automorphismes de P , supposé lisse [LM].

Proposition 2.1. *Sous les hypothèses qui précèdent, on a un isomorphisme de champs*

$$\mathcal{M}_P \xrightarrow{\sim} (\mathbf{G}/X)$$

$G = \text{Aut}_k(P)$ étant comme indiqué, le X -groupe algébrique des automorphismes de P .

Proof. Rappelons brièvement la définition du morphisme $\mathcal{M}_P \xrightarrow{\sim} \mathbf{G}/X$ (voir [DG] pour des détails). Si $(Q \in \mathcal{M}(U), f : U \rightarrow X)$ est un objet de marque P , il est clair que le U -schéma $\text{Isom}_U(Q, P \times_X U)$ est de manière naturelle, c'est à dire pour l'action à droite de $G \times_X U$, un G fibré principal de base U , i.e. un $G \times_X U$ -torseur. Un morphisme entre objets de marque P induit de manière évidente un morphisme entre toseurs associés. En sens inverse, si on a un morphisme $\alpha : U \rightarrow X$, et si $Q \rightarrow U$ est un $G \times_X U$ -torseur, le produit contracté ¹

$$Q \times^{G \times_X U} (P \times_X U) \quad (2.2)$$

définit un objet de marque P de base U ; de manière plus précise $(P, \alpha) \in \mathcal{M}_P(U)$. Ces deux constructions sont clairement inverses l'une de l'autre. D'une autre manière on peut observer que le champ $\mathcal{M}(P)$ est une gerbe sur X . cette gerbe est neutre car P en est une section sur X . Le résultat découle alors de ([LM], Lemme (3.31)) $\square$

2.2 Le champ classifiant $\mathbf{BG}$

Un exemple simple qui illustre la construction précédente revient à prendre comme marque k^n , de sorte que $\mathcal{M}$ est dans ce cas le champ des faisceaux localement libres

¹Supposons le toseur $Q \rightarrow U$, défini par un cocycle $g_{i,j} : U_{i,j} \rightarrow G \times_X U$, relativement à un recouvrement étale $(U_i \rightarrow U)_i$ de U . On peut alors voir $(g_{i,j})$ comme une donnée de descente sur la collection $P_i = P \times_X U_i$, relativement à ce recouvrement. Cela définit un objet $x \in \mathcal{M}(U)$ tel que $Q = \text{Isom}(x, P \times_X U)$.

de rang n sur les k -schémas. C'est le champ algébrique $\mathcal{Fib}_{n,X/S}$ de ([LM], Théorème (4.6.2.1)), avec $X = S = \text{Spec } k$. Les sections au dessus de U sont les fibrés vectoriels de rang n sur U , les morphismes étant les morphismes de changement de base. Alors le principe qui vient d'être rappelé dit que ce champ est isomorphe à $\mathbf{BGL}(n)$. Plus significatif pour la suite est le cas du groupe projectif linéaire $\mathbf{PGL}(n) = \text{Aut}(\mathbb{P}^n)$. Le champ classifiant $\mathbf{BPGL}(n)$ est isomorphe au champ dont les objets sont les fibrations en P^n au dessus d'un k -schéma (schémas de Severi-Brauer).

Le cas qui nous sera utile pour la suite est un mélange de ces deux exemples. Fixons un faisceau localement libre V sur P^1 , de rang $r \geq 1$, donc en vertu d'un théorème bien connu de Grothendieck, de la forme

$$V = \mathcal{O}(n_1) \oplus \cdots \oplus \mathcal{O}(n_r) \quad (2.3)$$

avec $n_1 \leq \cdots \leq n_r$. Soit la catégorie fibrée en groupoïdes $\mathcal{P}$, dont les objets sont les couples $(D \rightarrow S, E)$, avec $D \rightarrow S$ une fibration en $\mathbb{P}^1$, et E un fibré vectoriel sur D localement isomorphe à V , c'est à dire étale-localement sur S de la forme $\bigoplus_{i=1}^r \mathcal{L}_i$, où $\mathcal{L}_i$ est inversible de degré relatif n_i . Noter que cette définition a un sens car localement pour la topologie étale $D = \mathbb{P}_S^1$. L'identification des objets dans cet exemple est un exercice aisé ²:

Proposition 2.2. *1. La catégorie fibrée en groupoïdes $\mathcal{P}$ est un champ algébrique, i.e. $\mathcal{P} \cong \mathbf{BG}$.*

2. La marque des objets de $\mathcal{P}$ est $(\mathbb{P}^1, V)$. Le groupe G des automorphismes du modèle est le groupe qui linéarise universellement le fibré V . Ce groupe s'insère dans une suite exact

$$1 \rightarrow H = \text{Aut}(V) \rightarrow G \rightarrow \mathbf{PGL}(1) \rightarrow 1 \quad (2.4)$$

Proof. Le principe général indiqué au dessus s'applique si on plonge les objets dans un champ ambiant. Une preuve directe de l'identification 1) est aussi rapide. Le premier point se résume essentiellement à montrer que si (D, E) et (D', E') sont deux objets de $\mathcal{P}$ au-dessus du schéma S , alors le faisceau sur S_{et}

$$(T \rightarrow S) \mapsto \text{Isom}_T((D_T, E_T), (D'_T, E'_T)) \quad (2.5)$$

est représentable par un S -schéma séparé de type fini. On peut procéder en deux étapes. Soit d'abord le foncteur $\text{Isom}_S(D, D')$ qui est représenté par un S schéma affine. Si $D = \mathbb{P}_S^1$, c'est un toreur $\mathcal{I}$ sous le groupe $\mathbf{PGL}(1)_S$. Si $\Phi : D \times_S \mathcal{I} \xrightarrow{\sim} D' \times_S \mathcal{I}$

²On peut moduler la définition, par exemple en ajoutant à V une section globale. Les objets sont alors des triples (D, E, s) , $s \in \Gamma(D, E)$. Les automorphismes sont dans ce cas assujettis à fixer la section.

est l'isomorphisme universel, on est ramené à prouver que le foncteur défini sur la catégorie des $\mathcal{I}$ -schémas

$$(U \rightarrow \mathcal{I}) \mapsto \text{Isom}_U(E_U, \Phi^*(E')_U) \quad (2.6)$$

est représentable. L'argument est bien connu (voir par exemple [LM], Théorème 4.6.2.1); ce foncteur est en fait représenté par un schéma affine sur $\mathcal{I}$. Comme il est manifeste que l'objet $(\mathbb{P}^1, V) \in \mathcal{P}(k)$ définit un atlas, le premier point est essentiellement clair.

Identifions maintenant la marque des objets de $\mathcal{P}$. Il est clair que toute fibration en $\mathbb{P}^1$ de base S est localement (pour la topologie étale) de la forme $\mathbb{P}_S^1$, de manière équivalente, a localement pour la topologie étale une section. Supposons donc $D = \mathbb{P}_S^1$. Dans ce cas le module localement libre E étant localement isomorphe à V , on peut quitte à localiser si nécessaire, supposer que

$$E = \mathcal{O}_{\mathbb{P}_S^1}(n_1) \oplus \cdots \oplus \mathcal{O}_{\mathbb{P}_S^1}(n_r) = p^*(V)$$

en désignant par $p : \mathbb{P}_S^1 \rightarrow \mathbb{P}_k^1$ le morphisme de changement de base. Ce qui montre que la marque est bien le couple $(\mathbb{P}^1, V)$.

Pour décrire le groupe des automorphismes de l'objet marque, rappelons que si un groupe algébrique G , de multiplication μ agit sur une variété X , l'action étant notée $\sigma : G \times X \rightarrow X$, une G -linéarisation sur un faisceau cohérent F , est un isomorphisme

$$\Phi : \sigma^*(F) \xrightarrow{\sim} p_2^*(F) \quad (2.7)$$

vérifiant la relation de cocycle

$$(\mu, 1)^*\Phi = p_{2,3}^*\Phi.(1, \sigma)^*\Phi \quad (2.8)$$

En général un faisceau F localement libre de rang n , invariant par G , donc tel que $g^*(F) \cong F$ pour tout $g \in G$, n'est pas G -linéarisable, cependant il le devient si le groupe G est agrandi convenablement. De manière plus précise, l'argument rappelé en début de preuve montre qu'il existe un groupe algébrique $\tilde{G}$, et un morphisme de groupes $\tilde{G} \rightarrow G$, tel que les G -linéarisations de F correspondent de manière bijective aux sections de $\tilde{G} \rightarrow G$. En fait il suffit d'appliquer la construction du début au couple de faisceaux $(\mu^*(F), p_2^*(F))$, μ et p_2 étant respectivement l'action, et la projection $G \times X \rightarrow X$, de sorte que:

$$\tilde{G} = \text{Isom}(p_2^*(F), \mu^*(F)) \quad (2.9)$$

D'une manière simplifiée, les points de $\tilde{G}$ sont les couples (g, ϕ) , avec $g \in G$, et ϕ un isomorphisme $F \xrightarrow{\sim} g^*(F)$. La loi de composition est $(g, \phi)(h, \psi) = (gh, h^*(\phi)\psi)$.

Si on a pour tout $g \in G$, $g^*(F) \cong F$, alors ce groupe s'insère dans une extension, généralisant 1.1:

$$1 \rightarrow \text{Aut}(F) \rightarrow \tilde{G} \rightarrow G \rightarrow 1 \quad (2.10)$$

Revenons à la situation de départ, donc $F = V$, $X = \mathbb{P}^1$. Soit $\tilde{Q} \rightarrow S$ un $\tilde{G}_S$ -torseur. Avec ce torseur on construit en premier un fibré en $\mathbb{P}_1$, qui est le fibré associé

$$P = \tilde{P} \times_S^{\tilde{G}} \mathbb{P}^1 \rightarrow S$$

On construit ensuite un fibré vectoriel $E \rightarrow P$, localement sur S isomorphe à V , en utilisant le fait que par construction $\tilde{G}$ agit sur le fibré $V \rightarrow \mathbb{P}^1$. On prend le fibré vectoriel associé :

$$E = \tilde{Q} \times_S^{\tilde{G}} V_S \rightarrow P$$

Cette construction jointe à la précédente conduit à l'identification $\mathcal{P} \cong \mathbf{BG}$, et donc donne le résultat en ajustant les notations. $\square$

Notons que l'extension 2.10 n'est en général pas scindée, du fait que $\mathcal{O}(n)$ n'est $\mathbf{PGL}(1)$ -linéarisable que si n est pair; il possède bien entendu une $\mathbf{GL}(2)$ -linéarisation canonique. En effet soit $\alpha_g : \mathcal{O}(1) \xrightarrow{\sim} g^*(\mathcal{O}(1))$ la linéarisation tautologique de $\mathcal{O}(1)$, la linéarisation canonique de $\mathcal{O}(n)$ relative à $\mathbf{GL}(2)$ est celle donnée par $\alpha_g^{\otimes n}$. Cela définit la linéarisation tautologique de V :

$$\bigoplus_{i=1}^r \alpha_g^{\otimes n_i} : V \xrightarrow{\sim} g^*(V) \quad (g \in \mathbf{GL}(2)) \quad (2.11)$$

Noter que pour cette action $\lambda 1_2$ agit diagonalement sur V par $\text{diag}(\lambda^{n_1}, \dots, \lambda^{n_r})$.

On notera cependant que la linéarisation tautologique de V sous $\mathbf{GL}(2)$ se descend dans tous les cas en une linéarisation sous $\mathbf{GL}(2)/\mu_d$, en notant d le pgcd des n_i .

Le groupe H de la proposition 1.2 est aisé à décrire. Supposons la partition (n_i) de $r = \sum_{i=1}^r n_i$, prenant p valeurs distinctes $k_1 < \dots < k_p$, k_i apparaissant α_i fois. Alors V a une filtration canonique $F^\bullet$ (de Harder-Narasimhan)

$$0 \neq F^p \subset \dots \subset F^1 = E, \quad F^j / F^{j+1} = \mathcal{O}_{\mathbb{P}^1}(k_j)^{\oplus \alpha_j}$$

En fait si $V = \bigoplus_{j=1}^p \mathcal{O}_{\mathbb{P}^1}(k_j)^{\oplus \alpha_j}$, on a $F_j = \bigoplus_{m=j}^p \mathcal{O}_{\mathbb{P}^1}(k_m)^{\oplus (\alpha_m)}$. En conséquence un automorphisme de V respecte la filtration $F^\bullet$. Il est alors immédiat que $H = \text{Aut}(V)$ s'identifie à un groupe produit semi-direct

$$H = U \rtimes \prod_{j=1}^p \mathbf{GL}(\alpha_j)$$

expression dans la quelle le groupe unipotent U , est un sous-groupe du groupe des automorphismes de V induisant l'identité dans le gradué associé $gr^\bullet(F^\bullet)$.

Remarque 2.3.

Sous certaines conditions G est aussi un produit semi-direct. Supposons par exemple $\text{pgcd}(k_1\alpha_1, \dots, k_p\alpha_p) = d$. Soit alors une relation de Bezout $d = \sum_j m_j k_j \alpha_j$. Considérons le caractère de H donné par

$$\chi : H \rightarrow \prod_{j=1}^p \mathbf{GL}(\alpha_j) \xrightarrow{\psi} G_m$$

avec $\psi((g_j)) = \prod_j \det(g_j)^{m_j}$, et soit K le noyau de χ . Sous ces conditions le groupe H est le produit semi-direct $H = K \rtimes \mathbf{GL}(2)/\mu_d$. Notons $\alpha : \mathbf{GL}(2) \rightarrow G$ la section induite par la linéarisation canonique sur chaque facteur. Alors les éléments de K qui sont dans l'image de α , sont représentés par les matrices diagonales $\text{diag}(\lambda^{n_1}, \dots, \lambda^{n_r})$, avec $\psi(\alpha(g)) = \lambda^{\sum m_i n_i} = \lambda^d = 1$. Cette intersection est donc réduite à l'identité.

Dans le cas général, et d étant supposé pair, la suite (1.1) est scindée. Notons en effet que si les n_i sont tous pairs on obtient une section de $G \rightarrow \mathbf{PGL}(1)$ par factorisation de $g \in \mathbf{GL}(2) \mapsto \oplus_i \alpha_g^{\otimes n_i} \det(g)^{-n_i/2}$. $\diamond$

3 Courbes hyperelliptiques en caractéristique deux

3.1 Le champ $\mathcal{H}_g$

On fixe dorénavant un corps k algébriquement clos de caractéristique deux, par exemple $k = \overline{\mathbb{F}}_2$. Les schémas sont des k -schémas de type fini. Rappelons qu'une courbe hyperelliptique $p : C \rightarrow S$, de genre $g \geq 2$, de base un schéma S , est une S -courbe projective lisse à fibres connexes, munie d'un S -automorphisme involutif $\tau : C \xrightarrow{\sim} C$, de sorte que toute fibre géométrique C_s est une courbe hyperelliptique de genre g , d'involutions hyperelliptique la restriction de τ . L'involutions τ , qui est alors unique, est appelée l'involutions hyperelliptique de la courbe $p : C \rightarrow S$. La courbe quotient $D = C/\tau$ est une fibration tordue en $\mathbb{P}^1$ de base S , voulant dire que les fibres géométriques sont des $\mathbb{P}^1$). Notons que le quotient $\pi : C \rightarrow D$ est plat de degré deux. Il est connu que la formation de D commute à tout changement de base, du fait que les courbes sont lisses (voir par exemple [KL]). Justifions d'abord que les courbes hyperelliptiques (lisses) de genre $g \geq 1$ forment un champ algébrique. Si on accepte le cas $g = 1$, on notera que l'involutions n'est plus unique, cependant la définition du champ garde un sens. Une courbe (hyper)elliptique de genre un est donc un couple (C, τ) . Soient $p : C \rightarrow S$ et $p' : C' \rightarrow S'$, deux courbes hyperelliptiques de base S . Un morphisme au dessus de $h : S \rightarrow S'$ est comme d'habitude défini par un diagramme cartésien

$$\begin{array}{ccc} C & \xrightarrow{f} & C' \\ p \downarrow & & \downarrow p' \\ S & \xrightarrow{h} & S' \end{array} \quad (3.1)$$

le morphisme f vérifiant alors de manière automatique la règle de commutation $\tau'f = f\tau$. Les courbes hyperelliptiques forment une catégorie fibrée en groupoïdes $\mathcal{H}_g$ (ou $\mathcal{H}_{g,k}$) au dessus de la catégorie des k -schémas. De manière plus précise on a le résultat connu et aisé suivant [BM],[RO] que nous énonçons sans preuve:

Proposition 3.1. *Pour tout $g \geq 1$, le groupoïde $\mathcal{H}_g$ est un champ algébrique de Deligne-Mumford lisse.*

Une remarque cependant s'impose. La lissité du champ $\mathcal{H}_g$ est un fait exceptionnel, qui n'est pas partagé par beaucoup d'autres champs de Hurwitz en caractéristique positive, du moins lorsque la caractéristique de k divise l'ordre du groupe de monodromie. Ce fait découle par exemple du résultat plus précis qui dit que l'anneau versel des déformations $\frac{\mathbb{Z}}{2\mathbb{Z}}$ -équivariantes d'un point fixe formel (i.e. $k[[t]]$) de conducteur de Hasse m (m est forcément impair) est lisse de dimension $\frac{m+1}{2}$ [BM].

Nous allons proposer une description beaucoup plus explicite de $\mathcal{H}_g$, et se prêtant mieux au "calcul", description qui rendra par ailleurs la lissité évidente. Soit $p : C \rightarrow S$ un objet de $\mathcal{H}_g$, et soit $\pi : C \rightarrow D$ le revêtement associé de degré deux. La S -courbe $q : D \rightarrow S$, est un fibré en coniques, donc localement pour la topologie fpqc (en fait étale localement) une droite projective $\mathbb{P}_S^1$. Soit par ailleurs le faisceau localement libre de rang deux $\mathcal{E} = \pi_*(\mathcal{O}_C)$. Il est équipé d'une part d'une involution naturelle, celle induite par τ , notée pour cette raison τ , et aussi d'une structure de $\mathcal{O}_D$ -algèbre; de sorte qu'on récupère C par l'opération $C = \text{Spec}_D(\mathcal{E})$.

Soit la suite exacte définie en faisant le quotient par $\mathcal{O}_D = \ker(\tau - 1)$:

$$0 \rightarrow \mathcal{O}_D \rightarrow \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{L} \rightarrow 0 \quad (3.2)$$

Soient m_i ($i = 1, \dots, b$) les conducteurs de Hasse locaux en les b points de branchement de courbe hyperelliptique $\pi : C \rightarrow D = \mathbb{P}^1$ de genre g , définie sur le corps k . On notera que la formule de Riemann-Hurwitz donne

$$g + 1 = \sum_{i=1}^b \frac{m_i + 1}{2} \quad (3.3)$$

Dans la suite on posera $m = g + 1$.

Lemme 3.2. *Soit une courbe hyperelliptique de base S . Localement sur S on a $D \cong \mathbb{P}_S^1$, $\mathcal{L} \cong \mathcal{O}_{\mathbb{P}_S^1}(-m)$, de plus la suite exacte (2.2) est (localement sur S) scindée.*

Proof. On a par le théorème de Riemann-Roch $\chi(\mathcal{O}_C) = \chi(\mathcal{E}) = \deg(\mathcal{L}) + 2$, de sorte que $\deg(\mathcal{L}) = -m$. Pour montrer que (2.2) est localement scindée sur S , on peut supposer S affine, $D = \mathbb{P}_S^1$, et que $\mathcal{L} = \mathcal{O}(-m)$. Alors

$$\text{Ext}^1(\mathcal{O}(-m), \mathcal{O}_D) = H^1(D, \mathcal{O}(m)) = H^1(S, p_*\mathcal{O}(m)) = 0$$

Le résultat en découle. □

Dans la suite, lorsque les conclusions du lemme sont satisfaites, donc sur un recouvrement fpqc de S , on dira que la courbe hyperelliptique est rigidifiée³ dès lors que des identifications $D \cong \mathbb{P}_S^1$ et $\mathcal{E} \cong \mathcal{O}_D \oplus \mathcal{O}_D(-m)$ (i.e. une section de (2.2)) sont choisies. Dans ce cas la courbe $p : C \rightarrow S$ est déterminée de manière unique par la structure de $\mathcal{O}_D$ -algèbre sur $\mathcal{E} = \pi_*(\mathcal{O}_C)$, c'est à dire par la donnée de deux sections $A \in \Gamma(\mathcal{O}_D(m))$ et $B \in \Gamma(\mathcal{O}_D(2m))$.

De manière plus précise, pour toute base locale e de $\mathcal{L} = \mathcal{O}_D(-m)$, le carré de e est

$$e^2 = B(e^{\otimes 2}) + A(e)e \quad (3.4)$$

Pour que la structure d'algèbre (2.3) définisse en tout point $s \in S$ une courbe hyperelliptique, il est nécessaire que la condition $A(s) \neq 0$ soit satisfaite. Dans le cas contraire la projection sur $\mathbb{P}^1$ est radicielle; de même si $B(s) = 0$, la fibre est réductible. Les conditions sur le couple (A, B) qui assurent que la courbe $C(A, B) = \text{Spec}_D(\mathcal{E}(A, B))$ est hyperelliptique lisse seront explicitées ci-dessous. Dans cette notation, on désigne par $\mathcal{E}(A, B)$ l'algèbre définie par la multiplication (2.3) sur $\mathcal{O}_D \oplus \mathcal{O}_D(-m)$. Dans ce cas on notera que l'automorphisme hyperelliptique τ de $C(A, B)$ a pour expression par $\tau(e) = A(e) + e$.

On notera dans la suite $R \subset D$ le diviseur de ramification (relatif) du revêtement $\pi : C \rightarrow D$. Notons toujours sous les mêmes conditions le fait élémentaire:

Lemme 3.3. 1. Avec les notations introduites au-dessus, le diviseur F des points fixes de τ (ou diviseur de Weierstrass) a pour équation $A = 0$.

2. On a l'égalité $F = R$, et $\mathcal{O}_C(R) \cong \pi^*(\mathcal{L}^{-1})$.

Proof. 1) Localement, le diviseur des points fixes de τ a un idéal engendré par les éléments $\tau(\xi) - \xi$, pour ξ section de $\mathcal{O}_C$. Il est clair que cet idéal est engendré par $\tau(e) - e = A(e)$.

2) Noter que pour un revêtement galoisien de groupe G entre courbes lisses, et dans le contexte de la ramification sauvage, le diviseur de ramification, c'est à dire d'un point de vue local l'exposant de la différentielle, s'exprime en fonction de la fonction d'ordre, donc des multiplicités des diviseurs de points fixes F_σ des éléments $\sigma \in G$ par la formule bien connue [RO],[S]:

$$R = \sum_{\sigma \in G, \sigma \neq 1} F_\sigma \quad (3.5)$$

Dans notre situation G est d'ordre deux, cela donne l'égalité $R = F$. Le dernier point découle immédiatement de la description locale (1). $\square$

³En caractéristique $p \neq 2$, l'extension (3.2) a une section canonique, du fait de la décomposition de E en sous-espaces propres de τ , mais cela n'est plus le cas si $p = 2$.

3.2 Forme de Rosenhaim généralisée

Nous allons analyser les contraintes imposées sur le couple (A, B) pour que $C(A, B)$ soit hyperelliptique lisse. Soit toujours $S = \text{Spec}(k)$, avec k corps algébriquement clos de caractéristique deux. On a $D = \mathbb{P}^1$ de coordonnées homogènes X, Y , et la courbe $C(A, B)$ est décrite sur les ouverts affines $Y \neq 0$ et $X \neq 0$, par les équations respectives⁴

$$z^2 + A(x, 1)z = B(x, 1) \quad \text{resp.} \quad w^2 + A(1, y)w = B(1, y) \quad (w = \left(\frac{y}{x}\right)^m z) \quad (3.6)$$

avec

$$A(X, Y) = a_0 X^m + \cdots + a_m Y^m, \quad B(X, Y) = b_0 X^{2m} + \cdots + b_{2m} Y^{2m}$$

formes binaires, respectivement de degré m et $2m$. La lissité est visiblement équivalente au fait que les deux systèmes, dans lesquels l'indice X (resp. Y) désigne une dérivée partielle

$$\begin{cases} A(x, 1) = A'_X(x, 1)^2 B(x, 1) + B'_X(x, 1)^2 = 0 \\ A(1, y) = A'_Y(1, y)^2 B(1, y) + B'_Y(1, y)^2 = 0 \end{cases} \quad (3.7)$$

n'ont pas de solutions x (resp. y). De manière homogène, cela veut dire que les systèmes

$$\begin{cases} A(X, Y) = A'_X(X, Y)^2 B(X, Y) + B'_X(X, Y)^2 = 0 \\ A(X, Y) = A'_Y(X, Y)^2 B(X, Y) + B'_Y(X, Y)^2 = 0 \end{cases} \quad (3.8)$$

n'ont pas de solutions (x, y) avec $y \neq 0$ pour le premier (resp. (x, y) , $x \neq 0$ pour le second). Dans la suite, on identifiera l'espace affine des couples (A, B) à $\mathbb{A}^{m+1} \times \mathbb{A}^{2m+1} = \mathbb{A}^{3m+2}$. Les coordonnées étant $(a_0, \dots, b_{2m})$. On considèrera l'espace affine $\mathbb{A}^{3m+2}$ comme muni de plusieurs actions naturelles, d'une part de l'action de $\mathbb{G}_m^2$

$$(t, s).(A, B) = (tA, sB), \quad (t, s) \in (k^*)^2$$

d'autre part de l'action du groupe unipotent $\mathbb{G}_a^{m+1} = \Gamma(\mathbb{P}^1, \mathcal{O}(m))$ (groupe additif)⁵

$$\alpha.(A, B) = (A, B + \alpha A + \alpha^2) \quad (3.9)$$

Noter que cette action ne fait que traduire un changement de section dans la suite (3.2). Enfin l'action de $\mathbf{GL}(2)$ qui traduit un changement linéaire simultané des coordonnées $(A, B) \mapsto (A \circ \sigma^{-1}, B \circ \sigma^{-1})$.

⁴En genre $g = 2$, Igusa [I] utilise le modèle birationnel (forme de Rosenhaim) $xy^2 + (1 + ax + bx^2)y + x^2(c + dx + x^2) = 0$ valable en toute caractéristique.

⁵L'action de $\mathbb{G}_a^{m+1}$ n'est pas normalisée par $\mathbb{G}_m^2$, mais seulement par le sous-groupe à 1-paramètre $\lambda \mapsto (\lambda, \lambda^2)$. Le groupe produit semi-direct correspondant a une interprétation claire, comme groupe assurant des changements de repères (voir §4).

Pour transcrire en des termes commodes la condition de lissité, notons d'abord le lemme élémentaire suivant, dans lequel on note $\text{Res} = \text{Res}_{m,4m-2}$ le résultant de deux formes binaires de degrés respectifs m et $4m - 2$. Ce lemme montre que le polynôme $\Delta(A, B)$ jouit de propriétés analogues à celles du discriminant [GKZ].

Lemme 3.4. 1. *Il existe un polynôme $\Delta(A, B)$ en les coefficients de A et B , tel que*

$$\text{Res}(A, A_X'^2 B + B_X'^2) = a_0^2 \Delta, \quad \text{Res}(A, A_Y'^2 B + B_Y'^2) = a_m^2 \Delta \quad (3.10)$$

Les coefficients a_i de A étant de poids un, et ceux de B , les b_j , étant de poids deux, $\Delta(A, B)$ est homogène de degré $8m - 4$.

2. *Si m est pair, on a*

$$\Delta = \text{Res}(A, \frac{A_X'^2 B + B_X'^2}{Y^2}) = \text{Res}(A, \frac{A_Y'^2 B + B_Y'^2}{X^2}) \quad (3.11)$$

3. *Δ est invariant par l'action de $\mathbb{G}_a^{m+1}$; par ailleurs une substitution linéaire $\sigma \in GL(2)$ des variables donne $\Delta(A \circ \sigma, B \circ \sigma) = \det(\sigma)^{m(4m-2)} \Delta(A, B)$.*

Proof. 1- Utilisant le fait que k est de caractéristique deux, et que B est de degré $2m$, la formule d'Euler donne

$$X A_X' + Y A_Y' = mA, \quad X B_X' = Y B_Y'$$

ce qui conduit à l'identité

$$X^2 (A_X'^2 B + B_X'^2) = Y^2 (A_Y'^2 B + B_Y'^2) + m^2 A^2 B$$

Si on forme le résultant de A avec le polynôme homogène de degré $4m$, $X^2(A_X'^2 B + B_X'^2)$, l'égalité (3.12) donne immédiatement le résultat (2.8).

2- Si m est pair, (3.12) montre que X^2 divise $A_Y'^2 B + B_Y'^2$ et Y^2 divise $A_X'^2 B + B_X'^2$, de sorte que dans ce cas, on bien (2.9).

3- Pour vérifier l'invariance de Δ notons que si $A^* = A$, et $B^* = B + \alpha A + \alpha^2$, alors

$$(A'^*_X)^2 B^* + (B'^*_X)^2 = A_X'^2 B + B_X'^2 + \alpha A (A_X'^2) + \alpha_X'^2 A^2$$

de sorte que l'égalité

$$\text{Res}(A^*, A'^*_X{}^2 B^* + B'^*_X{}^2) = \text{Res}(A, A_X'^2 B + B_X'^2)$$

découle des propriétés élémentaires du résultant ([GKZ], Chapter 12). Pour prouver que Δ est un semi-invariant de $\mathbf{GL}(2)$ de poids $m(4m - 2)$, il suffit de vérifier ce fait, donc

$$\Delta(A \circ \sigma, B \circ \sigma) = \det(\sigma)^{m(4m-2)} \Delta(A, B)$$

pour $\sigma = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \mu \end{pmatrix}$. Dans le premier cas, avec la notation $F^*(X, Y) = F(Y, X)$, on a $(F^*)'_X = (F'_Y)^*$; on peut donc écrire

$$\begin{aligned} a_m^2 \Delta(A^*, B^*) &= \text{Res}(A^*, (A^*)'_X{}^2 B^* + (B^*)'_X{}^2) = \text{Res}(A^*, (A'_Y{}^2 B + B'_Y{}^2)^*) \\ &= \text{Res}(A, A'_Y{}^2 B + B'_Y{}^2) = a_m^2 \Delta(A, B) \end{aligned}$$

D'où le résultat dans ce cas. Le second cas est tout aussi immédiat. Dans le cas trois, avec la notation $F^*(X, Y) = F(\lambda X, \mu Y)$, on a du fait de la propriété de semi-invariance du résultant:

$$\begin{aligned} \text{Res}(A^*, (A^*)'_X{}^2 B^* + (B^*)'_X{}^2) &= \text{Res}(A^*, \lambda^2 (A'_X{}^2 B + B'_X{}^2)) \\ &= \lambda^{2m} (\lambda \mu)^{m(4m-2)} \text{Res}(A, A'_X{}^2 B + B'_X{}^2) \end{aligned}$$

Le résultat découle alors de la définition de Δ . □

Par exemple, dans le cas $m = 1$, on trouve

$$\Delta(A, B) = a_0^2 b_2 + a_1^2 b_0 + a_0 a_1 b_1 + b_1^2$$

Si $m = 2$, donc $g = 1$, et en utilisant les conventions d'écriture usuelles [SI]

$$A(X, Y) = a_1 XY + a_3 Y^2, \quad B(X, Y) = X^3 Y + a_2 X^2 Y^2 + a_4 XY^3 + a_6 Y^4$$

on trouve⁶ pour Δ l'expression bien connue:

$$\Delta = a_1^6 a_6 + a_1^5 a_3 a_4 + a_1^4 a_2 a_3^2 + a_1^4 a_4^2 + a_1^3 a_3^3 + a_3^4 \quad (3.12)$$

On retrouve bien l'expression du discriminant usuellement exprimé en fonction des coefficients b_2, b_4, b_6 , et le fait que le poids est 12 ([SI] p 46).

◇ Notons maintenant $X \subset \mathbb{A}^{3m+2}$ l'ouvert des couples (A, B) qui définissent (par (2.3)) des courbes hyperelliptiques $C(A, B)$ non singulières, et soit $S = \mathbb{A}^{3m+2} - X$ le fermé complémentaire. Nous allons décrire S , et donc X , en prouvant que S est l'hypersurface d'équation $\Delta \neq 0$, et qu'elle est irréductible; en fait on prouve mieux, la forme Δ est irréductible. Dans notre situation, caractéristique deux, on notera que le discriminant usuel perd une partie de sa signification, et d'ailleurs n'est plus irréductible comme on le voit immédiatement avec le discriminant cubique⁷

$$27a_0^2 a_3^2 + 4a_0 a_2^3 - 18a_0 a_1 a_2 a_3 + 4a_1^3 a_3 - a_1^2 a_2^2$$

⁶L'expression complète est: $\Delta(A, B) = a_2^4(a_1^4 b_0^2 + b_1^2) + a_0 a_1^4 a_2^3 b_1^2 + a_0^2 a_1^4 a_2^2 b_2^2 + a_0^3 a_1^4 a_2 b_3^2 + a_0^4(a_1^4 b_4^2 + b_3^4) + a_1 a_2^3(a_1^4 b_0 b_1 + a_1^2 b_1^3) + a_1^2 a_2^2(a_1^4 b_0 b_2 + a_1^2 b_1^2 b_2) + a_2(a_1^3 + a_0 a_1 a_2)(a_1^4 b_0 b_3 + a_1^2 b_1^2 b_3) + a_1^4(a_1^2 b_0 + b_1^2)(a_1^2 b_4 + b_3^2) + a_0 a_1^5 a_2^2 b_1 b_2 + a_0 a_1^6 a_2 b_1 b_3 + a_0 a_1^2 b_1(a_1^4 b_4 + b_3^2)(a_1^3 + a_0 a_1 a_2) + a_0^2 a_1^5 a_2 b_2 b_3 + a_0^2 a_1^4(a_1^2 b_4 + b_3^2) + a_0^3 a_1^3 b_3(a_1^2 b_4 + b_3^2)$.

⁷C'est un fait général: en caractéristique deux le polynôme de Vandermonde est symétrique, et dans l'algèbre des polynômes symétriques est un polynôme irréductible. Le discriminant est le carré du Vandermonde.

qui se réduit à $(a_0a_3 + a_1a_2)^2$ en caractéristique deux. Il faut dans le problème qui nous concerne lui substituer Δ . Pour se convaincre de cela, débutons par un lemme qui identifie S avec $\Delta = 0$:

Lemme 3.5. *Soit toujours $C(A, B)$ la courbe définie par la paire $(A, B) \in \Gamma(\mathcal{O}(m)) \oplus \Gamma(\mathcal{O}(2m))$. Alors $C(A, B)$ est non singulière si et seulement si $\Delta(A, B) \neq 0$. Si $\Delta(A, B) = 0$, et si le discriminant de la forme A est non nul, la courbe $C(A, B)$ est nodale (eventuellement réductible).*

Proof. Noter que si, soit $A = 0$, soit $B = 0$, alors $C(A, B)$ est purement inséparable sur $\mathbb{P}^1$ dans le premier cas, et réductible dans le second. Par ailleurs

$$0 \times \mathbb{A}^{2m+1} \cup \mathbb{A}^{m+1} \times 0 \subset \{\Delta = 0\}$$

On peut donc se limiter maintenant à des couples (A, B) avec $A \neq 0, B \neq 0$. Supposons en premier le couple (A, B) tel que $a_0 \neq 0$, ou bien $a_m \neq 0$. Supposons par exemple $a_0 \neq 0$. Alors $A(1, 0) \neq 0$, en conséquence le revêtement $C(A, B) \rightarrow \mathbb{P}^1$ étant non ramifié à l'infini (Lemme 2.3), les points singuliers éventuels de $C(A, B)$ sont au dessus de l'ouvert $Y \neq 0$. Si P est un tel point, au dessus du point de coordonnées (x, y) , avec $y \neq 0$, alors

$$A(x, y) = A'_X(x, y)^2 B(x, y) + B'_X(x, y)^2 = 0$$

ce qui implique $a_0^2 \Delta(A, B) = 0$. Donc $\Delta(A, B) = 0$. La réciproque est claire: si $\Delta(A, B) = 0$ alors $A(X, Y) = A'_X(X, Y)^2 B(X, Y) + B'_X(X, Y)^2 = 0$ doit avoir une solution non triviale, et comme $a_0 \neq 0$, cette solution est (x, y) avec $y \neq 0$. Ce point définit un point singulier de $C(A, B)$.

L'argument est le même si $a_m \neq 0$. Cela prouve en particulier le résultat si $a_0 \neq 0$, ou bien $a_m \neq 0$. Notons en général que si on effectue un changement linéaire des variables, les courbes $C(A, B)$ et $C(A \circ \sigma, B \circ \sigma)$ sont isomorphes. Si $a_0 = a_m = 0$, on se ramène au cas $a_0 \neq 0$ en effectuant un tel changement de variables $x \rightarrow x, y \rightarrow \alpha x + y$, avec $A(1, \alpha) \neq 0$. Cela est toujours possible du fait que le corps de base est supposé algébriquement clos. L'argument est licite du fait que $\Delta(A, B)$ est semi-invariant (Lemme 3.4 (3)). Supposons les dernières conditions réalisées. On peut supposer que $a_0 \neq 0$; soit un point singulier (z_0, x_0) au-dessus de $(x_0, 1)$. Comme $A_x(x_0, 1) \neq 0$, il est clair que la courbe affine d'équation $z^2 + A(x, 1)z = B(x, 1)$ qui a pour forme locale en (z_0, x_0)

$$(z - z_0)^2 + (z - z_0)(x - x_0)A^*(x) = (x - x_0)^2 B^*(x), \quad A^*(x_0) \neq 0$$

présente un point double en (z_0, x_0) . Si $B = 0$, la courbe correspondante est réductible. $\square$

Du fait que la caractéristique est deux, on dispose aussi de l'action du groupe additif $\mathbb{G}_a^{m+1}$ sur $\mathbb{A}^{3m+2}$ décrite ci-dessus. Pour une autre description de l'hypersurface $\Delta = 0$, introduisons le sous ensemble $Z \subset \mathbb{A}^{3m+2}$ défini par la condition $(A, B) \in Z \iff A \neq 0, B \neq 0$, et il existe une forme linéaire $\ell \neq 0$ telle que

$$\ell/A, \ell^2/B \quad (3.13)$$

Il a été noté que $\Delta(\alpha.(A, B)) = \Delta(A, B)$, par ailleurs il est clair que X est stable par cette action, du fait que $C(\alpha.(A, B)) \cong C(A, B)$.

Théorème 3.6. *Le polynôme $\Delta(A, B)$ est irréductible, et X est l'ouvert complémentaire de l'hypersurface $\Delta \neq 0$. On a*

$$\{\Delta = 0\} = \overline{\mathbb{G}_a^{m+1}.Z} \quad (3.14)$$

Proof. Il est immédiat de voir que si $(A, B) \in Z$ alors la courbe $C(A, B)$ est singulière. Rappelons que $S = \{\Delta = 0\}$ est le complémentaire de X , lieu des paires (A, B) telles que $C(A, B)$ est singulière (Lemme 3.5). Observons d'abord que Z est un fermé irréductible⁸ de $(\mathbb{A}^{m+1} - 0) \times (\mathbb{A}^{2m+1} - 0)$ de dimension $3m$. L'image de $\pi(Z)$ de Z dans $\mathbb{P}^m \times \mathbb{P}^{2m}$ qui est aussi l'image du morphisme

$$\mathbb{P}^1 \times \mathbb{P}^{m-1} \times \mathbb{P}^{2m-2} \longrightarrow, ([l], [A^*], [B^*]) \mapsto ([lA^*], [l^2B^*])$$

est un fermé irréductible. Comme Z est stable par l'action de $\mathbb{G}_m^2$ (définie dans la section 3.2), le résultat est clair, sauf peut être la dimension. Mais il est immédiat de voir que $\dim \pi(Z) = 3m - 2$, et donc $\dim Z = 3m$. Montrons maintenant que $S \subset \mathbb{A}^{3m+2}$ est décrit par

$$S = \overline{\mathbb{G}_a^{m+1}.Z} \quad (3.15)$$

On peut d'abord observer que l'adhérence de Z dans $\mathbb{A}^{3m+2}$ contient les couples $(A, 0)$. En effet, si on écrit $A = lA_0$ pour une certaine forme linéaire l , alors si B_0 est une quelconque forme de degré $2m - 2$

$$\lim_{t \rightarrow 0} (A, tl^2B_0) = (A, 0)$$

Un argument analogue montre que $\overline{Z} \cap (0 \times \mathbb{A}^{2m+1})$ est l'ensemble des couples $(0, B)$, B étant de discriminant nul⁹. Observons maintenant que l'adhérence $\overline{\mathbb{G}_a^{m+1}.Z}$ est un fermé irréductible de codimension un. Soit le morphisme $\varphi : \mathbb{G}_a^{m+1} \times Z \rightarrow \mathbb{A}^{3m+2}$:

$$\varphi(\alpha, (A, B)) = (A, F = B + \alpha A + \alpha^2)$$

⁸Si $m = 1$, les équations de Z sont $b_1 = 0, a_0^2b_2 = a_1^2b_0$.

⁹On peut de manière analogue voir directement que $0 \times \mathbb{A}^{2m+1} \subset \overline{\mathbb{G}_a^{m+1}.Z}$. Il suffit de voir (si $m \geq 2$) que l'hypersurface définie par l'annulation du discriminant d'une forme de degré $2m$ n'est pas stable par l'action du groupe additif $(\alpha, B) \mapsto B + \alpha^2$. Par exemple en notant que la forme $X^{2m} + aXY^{2m-1}$ n'a que des facteurs simples si $a \neq 0$.

Si (A, F) est dans l'image de φ , la fibre en ce point est en bijection avec les α tels que $B = F + \alpha A + \alpha^2$ soit de discriminant nul, donc est de dimension m . De la sorte la dimension cherchée est bien $3m + 1$.

Pour conclure, soit $(A, B) \in S$, et montrons que $(A, B) \in \overline{\mathbb{G}_a^{m+1} \cdot Z}$. En vertu de ce qui vient d'être dit, il suffit de vérifier cela en dehors d'un fermé de codimension ≥ 2 , en particulier on peut supposer que $A \neq 0$, et $B \neq 0$. Supposons alors que le point (x_0, y_0) soit un point "singulier" de $C(A, B)$, avec par exemple $y_0 \neq 0$. Alors $A(x_0, y_0) = 0$, et quitte à effectuer une substitution $(A, B) \mapsto (A, B + \alpha A + \alpha^2)$, on peut s'arranger pour que $B(x_0, y_0) = 0$. Si $B = 0$, la conclusion est claire, car alors $(A, B) \in \mathbb{G}_a^{m+1} \cdot Z$. Dans le cas contraire on doit avoir $B'_X(x_0, y_0) = 0$, et alors ayant $A(x_0, y_0) = B(x_0, y_0) = B'_X(x_0, y_0) = 0$, on obtient $(A, B) \in Z$. L'inclusion opposée est claire. En conclusion on a

$$S = \{\Delta = 0\} = \overline{\mathbb{G}_a^{m+1} \cdot Z}$$

En particulier cela montre l'irréductibilité de l'hypersurface S .

Pour terminer la preuve du théorème 3.6 reste à voir que la forme Δ est irréductible. Pour un résultant ou discriminant ordinaire en caractéristique zéro, c'est un fait bien connu [GKZ]. Du fait que S est une hypersurface irréductible, il suffit de voir que Δ n'est pas de la forme Δ_0^e pour un $e \geq 2$.

Pour cela considérons les formes génériques

$$A = \prod_{i=1}^m (X - \alpha_i Y) \in k[\alpha_1, \dots, \alpha_m] = k[\alpha], \quad B = \sum_{j=0}^{2m} b_j X^{2m-j} Y^j \in k[b_0, \dots, b_{2m}]$$

$\alpha_1, \dots, \alpha_m, b_0, \dots, b_{2m}$ étant une collection d'indéterminées. On a sous ces conditions

$$\Delta(\alpha, b) = \prod_{i=1}^m (A_X'^2 B + B_X'^2)(\alpha_i, 1)$$

En d'autres termes, on se place dans

$$R = k[a_1, \dots, a_m, b_0, \dots, b_{2m}] \subset S = k[\alpha_1, \dots, \alpha_m, b_0, \dots, b_{2m}]$$

les corps de fractions formant une extension galoisienne de groupe $\mathfrak{S}_m$. Supposons avoir $\Delta = \Delta_0^e$, avec Δ_0 nécessairement irréductible. Posons

$$G(X) = G(\alpha, b)(X) = (A_X'^2 B + B_X'^2)(X, 1)$$

alors le polynôme G a ses coefficients dans R , et par définition

$$\prod_{i=1}^m G(\alpha_i) = \Delta_0^e$$

Observons que $G(\alpha_1) \in S$ est irréductible. Il ne peut avoir de facteur irréductible dans $k[\alpha]$. Un tel facteur en effet diviserait dans $k[\alpha]$ les polynômes déduits de G par les spécialisations $B = X^{2m}$, et $B = Y^{2m}$, imposant à ce polynôme d'être un facteur de $A'_X(\alpha_1)$, situation clairement impossible. Du fait que le degré en les variables $b_0, \dots, b_{2m}$ est deux, une décomposition en facteurs irréductibles ne peut donc être que de la forme $G(\alpha_1) = uv$ ($u, v \in S$). On voit immédiatement comme conséquence de l'argument précédent que u et v doivent alors être de degré un en les variables b_i . Posons

$$u = \phi_0 + \sum_{i=0}^{2m} u_i b_i, \quad v = \psi_0 + \sum_{j=0}^{2m} v_j b_j \quad (\phi_0, \psi_0, u_i, v_j \in k[\alpha_1, \dots, \alpha_m])$$

En développant le produit uv (2.17), et en identifiant avec $G(\alpha_1)$, on trouve $\phi_0 \psi_0 = 0$, pour tout $k = 0, \dots, 2m$

$$u_k v_k = \begin{cases} \alpha_1^{2(2m-k-1)} & \text{si } k \text{ est impair} \\ 0 & \text{si } k \text{ est pair.} \end{cases}$$

et $u_i v_j + u_j v_i = 0$ si $i \neq j$. Supposons par exemple $\phi_0 = 0$; alors en utilisant les relations qui précèdent on trouve que pour tout k , $u_k \neq 0$, ceci du fait que $\psi_0 u_k = A'_X{}^2(\alpha_1) \alpha_1^{2m-k}$. Cela implique aisément $v_k = 0$ pour tout k , ce qui est impossible. Ainsi $G(\alpha_1)$ est irréductible dans $k[\alpha, b]$. Il est immédiat d'en déduire que la norme $\prod_i G(\alpha_i)$ est un élément irréductible de l'algèbre de polynômes $k[a, b]$.

Cela montre finalement que $e = 1$, donc que $\Delta(A, B)$ est irréductible. Ce raisonnement permet de prouver de nouveau, sans référence à l'argument qui précède l'irréductibilité de Δ . $\square$

4 La stratification de Hasse du champ $\mathcal{H}_g$

4.1 $\mathcal{H}_g$ comme champ quotient

Dans cette section nous prouvons notre résultat principal qui est la description de $\mathcal{H}_g$ comme un champ quotient. Comme dans les sections antérieures, le champ $\mathcal{H}_g$ est supposé défini sur le corps algébriquement clos k de caractéristique deux. Comme indiqué dans l'introduction la description que nous allons proposer peut s'interpréter comme une variante de l'utilisation de la forme de Weierstrass (ou de Rosenhaim) généralisée [I]. On observera cependant que si $g = 1$, on a $\mathcal{H}_1 \neq \mathcal{M}_{1,1}$.

Soit une courbe hyperelliptique $p : C \rightarrow S$, et considérons le revêtement séparable de degré deux $\pi : C \rightarrow D = C/\tau$. On garde les notations de la section 2, en particulier τ est l'involution hyperelliptique. On déduit de cette donnée la $\mathcal{O}_D$ algèbre localement libre $\mathcal{E} = \pi_*(\mathcal{O}_C)$, et l'extension correspondante (3.2). Localement pour la topologie

étale sur S , cette donnée se trivialise en (Lemme 3.2)

$$D = \mathbb{P}_S^1, \quad \mathcal{E} = \mathcal{O}_D \oplus \mathcal{O}_D(-m) \quad (4.1)$$

La structure d'algèbre sur $\mathcal{E}$ est alors complètement décrite par la donnée d'un couple de sections (§3.4)

$$(A, B) \in \Gamma(\mathcal{O}_D(m)) \times \Gamma(\mathcal{O}_D(2m))$$

conjointement avec le sous-fibré $\mathcal{O}_D$, engendré par l'élément unité. Il a été rappelé (Proposition 2.2) que l'ensemble des trivialisations de la donnée $(D, \mathcal{E}, \tau)$, c'est à dire le S -schéma

$$\text{Isom}((\mathbb{P}_S^1, \mathcal{O} \oplus \mathcal{O}(-m)), (D, \mathcal{E})) \quad (4.2)$$

est un toreur sous le groupe des automorphismes du modèle, et réciproquement tout toreur sous ce groupe est de cette forme. Soit dans ce contexte le groupe $G \times S$, donné comme $G = \text{Aut}((\mathbb{P}_S^1, \mathcal{O} \oplus \mathcal{O}(-m)))^{10}$. On a vu que ce groupe se réalise comme un sous-groupe du groupe qui linéarise universellement le fibré modèle $\mathcal{O}_{\mathbb{P}^1} \oplus \mathcal{O}_{\mathbb{P}^1}(-m)$. Il s'insère dans ce cas particulier dans une extension

$$1 \rightarrow H \rightarrow G \rightarrow \mathbf{PGL}(1) \rightarrow 1 \quad (4.3)$$

$H = \text{Aut}(\mathcal{O}_{\mathbb{P}^1} \oplus \mathcal{O}_{\mathbb{P}^1}(-m))$ étant le groupe des automorphismes égaux à l'identité sur $\mathcal{O}_{\mathbb{P}^1}^{11}$, c'est à dire

$$H = \left(\begin{pmatrix} 1 & \alpha \\ 0 & \beta \end{pmatrix}, \alpha \in \Gamma(\mathcal{O}_{\mathbb{P}^1}(m)), \beta \in \Gamma(\mathcal{O}_S^*) \right)$$

Sa structure précise, cas particulier du lemme 2.3, est rappelée pour mémoire:

Lemme 4.1. 1. Si m est pair, $G \cong H \rtimes \mathbf{PGL}(1)$ (la suite (4.3) est scindée).

2. Si m est impair $G \cong \Gamma(\mathcal{O}(m)) \rtimes \mathbf{GL}(2)/\mu_m$.

Dans l'assertion (2) le produit semi-direct est défini relativement à l'action évidente de $\mathbf{GL}(2)/\mu_m$ sur $\Gamma(\mathcal{O}(m))$. On a donc dans tous les cas $G \cong \Gamma(\mathcal{O}(m)) \rtimes \mathbf{GL}(2)/\mu_m$.

Proof. 1) On considère pour tout entier n , le sous-groupe du groupe des matrices diagonales $G_m \subset \mathbf{GL}(2)$, noyau de $G_m \rightarrow G_m, \lambda \rightarrow \lambda^n$. Ce sous-groupe isomorphe à μ_n , est noté μ_n . Noter que si n est pair, il n'est pas étale; cependant le groupe dual est toujours $\frac{\mathbb{Z}}{n\mathbb{Z}}$. Le faisceau $\mathcal{O}(-m)$ admet une $\mathbf{PGL}(1)$ -linéarisation canonique, qui provient par passage au quotient et puissance $-m$ de la linéarisation de $\mathcal{O}(1)$ de groupe $\mathbf{GL}(2)$. Si cette dernière est $\alpha_g : \mathcal{O}(1) \cong [g]^*(\mathcal{O}(1))$, la section de (4.3) est

$$[g] \mapsto ([g], \alpha_g^{\otimes -m})$$

¹⁰Rappelons que les automorphismes sont assujettis à fixer la section unité.

¹¹Dans cette situation il faut préciser que l'objet marque est un triplet $(\mathbb{P}^1, V, \mathcal{O}_{\mathbb{P}^1} \hookrightarrow V)$. Les automorphismes sont ceux qui se réduisent à l'identité sur la section unité

Dans le cas (2), la linéarisation de $\mathcal{O}(m)$ sous $\mathbf{GL}(2)$ factorise par $\mathbf{GL}(2)/\mu_m$. Il en résulte une section $\mathbf{GL}(2)/\mu_m \rightarrow G$; explicitement $\bar{g} \mapsto ([g], \alpha_g^{\otimes -m})$. Il est visible que l'image du sous-groupe des homothéties de $\mathbf{GL}(2)$ est le sous-groupe

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \star \end{pmatrix} \subset H$$

On en tire le fait que $G = \Gamma(\mathcal{O}(m)) \rtimes \mathbf{GL}(2)/\mu_m$. Comme cet argument ne dépend pas de la parité de m , le résultat est donc valable dans les deux cas. $\square$

Notons que le groupe G agit naturellement sur l'espace affine $\mathbb{A}^{3m+2}$, de sorte que l'ouvert X est G -stable. Cette action mélange l'action de $\mathbf{GL}(2)$, plus précisément de $\mathbf{GL}(2)/\mu_m$ d'une part et celle de H . L'action de H (exprimée à droite) qui traduit les changements de trivialisations du fibré $\mathcal{E}$ est

$$\begin{pmatrix} 1 & \alpha \\ 0 & \beta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B \\ A \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \beta^2 B + \beta \alpha A + \alpha^2 \\ \beta A \end{pmatrix} \quad (4.4)$$

Le couple de sections (A, B) qui décrit la structure d'algèbre sur $\mathcal{E}$ une fois trivialisé, s'interprète alors comme un morphisme G -équivariant

$$\text{Isom}((\mathbb{P}_S^1, \mathcal{O} \oplus \mathcal{O}(-m)), (D, \mathcal{E})) \longrightarrow X$$

Dès lors, on peut énoncer le résultat, en acceptant l'existence de $\mathcal{H}_{g,\mathbb{Z}}$ [RO] (pour la définition d'un champ quotient, voir par exemple [LM]):

Théorème 4.2. *On a un isomorphisme de champs $\mathcal{H}_g = \mathcal{H}_{g,k} \cong [X/G]$, $[X/G]$ étant le champ quotient de X par G . En particulier $\mathcal{H}_g$ est lisse. En conclusion, et de manière plus générale, $\mathcal{H}_{g,\mathbb{Z}}$ est lisse sur $\mathbb{Z}$.*

$\square$

4.2 La stratification de Hasse

Soit une courbe hyperelliptique définie sur le corps k . On sait (Lemme 3.3) que le diviseur des points fixes F de l'involution τ a dans la description qui précède pour équation $A = 0$. Notons que le sens de ce diviseur, qui est le diviseur de Weierstrass [KL], devient plus clair si on fait intervenir la ramification supérieure, c'est à dire le conducteur de Hasse en chaque point fixe P_i , ($1 \leq i \leq b$) [BM],[S]. Rappelons que si P est un point fixe de τ , et si $t \in \mathcal{M}_P$ est une uniformisante en P , le conducteur de Hasse m_P est défini par $v_P(\tau(t) - t) = m_P + 1$. On sait que m_i est impair. En résumé

Lemme 4.3. *On a*

$$F = \sum_{i=1}^b (m_i + 1) P_i, \quad \deg(F) = 2m = 2g + 2 \quad (4.5)$$

m_i désignant le conducteur de Hasse en P_i . De plus si C est une courbe de base S , alors F est un diviseur relatif sur S de degré $2m$. Il existe un diviseur $Z \subset D$, de degré m , tel que $F = \pi^*(Z)$.

D'une autre manière considérons les groupes de ramification supérieurs; en P_i , le conducteur étant m_i , il sont définis par

$$\Gamma = (1, \tau) = \Gamma_0 = \cdots = \Gamma_{m_i} \supsetneq \Gamma_{m_i+1} = 1$$

Si on écrit les multiplicités $\frac{m_i+1}{2}$ de manière décroissante, on définit de la sorte une partition de m . Noter qu'à toute partition $\mu = (\mu_1 \geq \cdots \geq \mu_b > 0)$ de m on peut associer de cette manière une courbe hyperelliptique de genre g . On notera pour une partition donnée μ , $\mathcal{H}_g(\mu)$ le champ des courbes hyperelliptiques à ramification fixée de type μ . On a le résultat aisé suivant:

Proposition 4.4. *Pour toute partition μ de $m = g + 1$, de longueur b , le champ $\mathcal{H}_g(\mu)$ est un sous champ localement fermé et lisse de codimension $g - b + 1$ de $\mathcal{H}_g$.*

Proof. Il est clair en vertu du théorème 4.2, et du Lemme 4.3, que $\mathcal{H}_g(\mu)$ est le champ quotient $[X(\mu)/G]$, avec $X(\mu)$ le sous-schéma localement fermé de X dont les points sont les couples (A, B) , la forme A étant telle que $\text{Div}(A)$ est de type μ (Lemme 4.3). Le résultat suit. $\square$

On notera que si $\mu = (2, 1, \dots, 1)$, $b = m$, alors l'adhérence de cette strate est un diviseur de $\mathcal{H}_g$. Pour les autres strates la codimension est au moins deux. Par ailleurs, la formule de Crew pour le calcul du p -rang r_C d'un revêtement galoisien $\pi : C \rightarrow D$, de groupe Q , génériquement étale de courbes propres, lisses et connexes sur un corps algébriquement clos de caractéristique $p > 0$ (voir par exemple [R])

$$r_C - 1 = |Q|(r_D - 1) + \sum_{y \in D} (e_y - 1) \quad (4.6)$$

les e_y désignant les indices de ramification, montre que le long d'une strate $\mathcal{H}_g(\mu)$, le 2-rang est constant égal à $b - 1$. En particulier la strate ouverte est formée des courbes ordinaires, et la strate fermée, de dimension $m = g - 1$, est constituée de courbes de 2-rang zéro.

Remarque 4.5.

Précisons le lien si $g = 1$ entre les deux champs $\mathcal{H}_1$ et $\mathcal{M}_{1,1}$ (voir aussi [AV]). Notons d'abord qu'il y a un morphisme naturel

$$\psi : \mathcal{M}_{1,1} \longrightarrow \mathcal{H}_1 \quad (4.7)$$

donné sur les objets par $\psi(C \rightarrow S, O) = (C \rightarrow S, \tau)$, avec pour τ l'involution $x \mapsto -x$; l'opposé $-x$ est défini relativement à la loi de groupe sur E , d'unité la section O .

Comme cette involution est la seule fixant le S -point O , cela définit bien un foncteur, i.e. un morphisme de champs. Montrons que ce morphisme est représentable, plat, fini de degré quatre. De manière plus précise c'est le diviseur de Cartier universel $\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{H}_g$ (Lemme 3.3). Cela est à près immédiat. Soit $S \rightarrow \mathcal{H}_1$, un point défini par la courbe $(C/S, \tau)$. Une section au dessus de T , du 2-produit fibré $\mathcal{M}_{1,1} \times_{\mathcal{H}_1} S$ est la donnée d'un morphisme $T \rightarrow S$, d'une courbe elliptique $E \rightarrow T$, avec section nulle $O : T \rightarrow E$, et d'un isomorphisme équivariant relativement aux involutions $\phi : E \xrightarrow{\sim} C \times_S T$. La section O définit ainsi un T -point de $F \rightarrow S$. Il est clair que $\mathcal{M}_{1,1} \times_{\mathcal{H}_1} S \cong \mathcal{F}$. $\diamond$

5 Le groupe de Picard de $\mathcal{H}_g$

Rappelons que si on regarde $\mathcal{H}_g$ comme étant défini sur un corps k de caractéristique¹² $p \neq 2$, alors Arsie et Vistoli ([AV], thm 5.1, remark 5.5) ont montré que le groupe de Picard de $\mathcal{H}_g$ (voir [AV], [M], [V] pour la définition du groupe de Picard) est

$$\text{Pic}(\mathcal{H}_g) = \begin{cases} \frac{\mathbb{Z}}{(8g+4)\mathbb{Z}} & \text{si } g \text{ est impair} \\ \frac{\mathbb{Z}}{(4g+2)\mathbb{Z}} & \text{si } g \text{ est pair} \end{cases} \quad (5.1)$$

On va prouver que ce résultat subsiste sans restriction sur la caractéristique, donc si la caractéristique est deux, bien que la description du champ soit assez différente. La détermination du groupe $\text{Pic}(\mathcal{H})$ lorsque $\mathcal{H} = [X/G]$ est un champ quotient d'une variété lisse X , est dans certains cas aisée. De la définition du groupe de Picard, on tire en effet

$$\text{Pic}(\mathcal{H}) = \text{Pic}_G(X) \quad (5.2)$$

où $\text{Pic}_G(-)$ désigne le groupe des faisceaux inversibles G -linéarisés. Le lemme suivant permet dans certains cas, et pour des G -variétés affines, d'expliciter le groupe de Picard équivariant. Rappelons que si X est une k -variété normale (de type fini), on pose (définition de Rosenlich) $U_k(X) = \Gamma(X, \mathcal{O}_X^*)/k^*$. On sait que ce groupe abélien est libre de type fini, et que

$$U_k(X \times Y) = U_k(X) \times U_k(Y)$$

Si G est un k -groupe algébrique affine lisse, alors $U_k(G) = \hat{G}$, le groupe des caractères.

Lemme 5.1. *Soit $X = \text{Spec}(R)$ le spectre d'une k -algèbre de type fini normale, définie sur un corps algébriquement clos k . On suppose que X est muni d'une action régulière d'un groupe algébrique lisse connexe G . On a alors une suite exacte¹³:*

$$0 \rightarrow \frac{\hat{G}}{\langle \chi \rangle} \rightarrow \text{Pic}_G(X) \xrightarrow{\alpha} \text{Pic}(X)^G \xrightarrow{\beta} H^2(G, k^*) \quad (5.3)$$

¹²plus précisément p premier à 2 et $g + 1$.

¹³Le morphisme β traduit l'obstruction à ce qu'un faisceau inversible G -invariant soit G -linéarisable; il ne sera pas utilisé.

dans laquelle le terme $\text{Pic}(X)^G$ désigne le sous-groupe des éléments G -invariants de $\text{Pic}(X)$, et $\langle \chi \rangle$ désigne le sous-groupe engendré par les "poids" des éléments de $U_k(X)$. En particulier si $\text{Pic}(X) = 0$ (R est factoriel), on a $\text{Pic}_G(X) = \frac{\hat{G}}{\langle \chi \rangle}$.

Proof. Précisons que dans la suite (5.3), le morphisme α est l'oubli de l'action de G . Le groupe G étant un groupe algébrique connexe (lisse ou non), agissant sur une variété normale X , on sait qu'il y a une suite exacte

$$0 \rightarrow H^1(G, \Gamma(X, \mathcal{O}_X)^*) \rightarrow \text{Pic}(X)^G \xrightarrow{\alpha} \text{Pic}(X) \rightarrow \text{Pic}(G) \quad (5.4)$$

La description du noyau de α traduit le fait qu'une linéarisation du fibré trivial de rang un $X \times \mathbb{A}^1 \rightarrow \mathbb{A}^1$ est décrite au niveau des points par

$$(g, x, t) \mapsto (gx, \varphi(g, x)t)$$

la fonction φ vérifiant la relation de cocycle

$$\varphi(gg', x) = \varphi(g, g'x) \varphi(g', x)$$

et étant déterminée modulo un cobord $(g, x) \mapsto \frac{f(gx)}{f(x)}$. Dans la situation qui nous occupe X est un ouvert affine d'un espace affine, on a donc $\text{Pic}(X) = 0$, on est ainsi essentiellement ramené au calcul du groupe $H^1(G, \Gamma(X, \mathcal{O}_X)^*)$. Avec les hypothèses faites sur X , le résultat de Rosenlich rappelé au-dessus montre qu'un cocycle est représenté par un caractère de G . Le reste en découle immédiatement. $\square$

On est maintenant en mesure de calculer le groupe de Picard du champ $\mathcal{H}_g$ sur un corps algébriquement clos k de caractéristique deux, et prouver le résultat annoncé dans l'introduction. La conclusion qui peut surprendre, est que le résultat est le même qu'en caractéristique $p \neq 2$. Cela est sans doute à rapprocher du fait que pour les revêtements doubles la lissité est préservée. On notera cependant que dans cette description la première classe de Chern du fibré de Hodge n'est pas dans tous les cas un générateur du groupe de Picard (Remarque 4.5). Tenant compte de [AV], le résultat suivant montre (5.1) est vrai en toute caractéristique.

Théorème 5.2. *Le groupe de Picard du champ $\mathcal{H}_g = \mathcal{H}_{g,k}$ ($g \geq 1$), supposé défini au-dessus d'un corps algébriquement clos k de caractéristique $p = 2$, est :*

$$\text{Pic}(\mathcal{H}_g) = \begin{cases} \frac{\mathbb{Z}}{(8g+4)\mathbb{Z}} & \text{si } g \text{ est impair} \\ \frac{\mathbb{Z}}{(4g+2)\mathbb{Z}} & \text{si } g \text{ est pair} \end{cases} \quad (5.5)$$

Proof. Le théorème 4.2 dit que $\mathcal{H}_g = [X/G]$, le groupe G étant décrit dans le lemme 4.1, et avec $X = \mathbb{A}^{3m+2} - \{\Delta = 0\}$. Il a été observé d'autre part (§3) que le diviseur irréductible et réduit $\Delta = 0$ est invariant sous l'action naturelle de G , et que plus

précisément Δ est un polynôme irréductible semi-invariant. Si $\chi \in \hat{G}$ est le poids de Δ , alors (Lemme 5.1) on peut conclure:

$$\text{Pic}(\mathcal{H}_g) = \frac{\hat{G}}{\mathbb{Z}\chi}$$

Comme le groupe G est produit semi-direct de $\mathbf{GL}(2)/\mu_m$ par un groupe unipotent, il en découle que $\hat{G} = \widehat{\mathbf{GL}(2)/\mu_m}$ et donc $\hat{G} = \mathbb{Z}\psi$ avec $\psi = \det^m$ si m est impair, sinon $\psi = \det^{\frac{m}{2}}$ si m est pair. Il reste donc à trouver le poids $\chi = \psi^e$ de Δ . Il est suffisant pour cela de faire agir le sous-groupe des matrices diagonales, c'est à dire G_m via $\lambda \mapsto \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}$. Alors A est de poids m (relativement à l'action de G_m), et $A'_X{}^2 B + B'_X{}^2$ est de poids $4m - 2$. Donc le poids correspondant de $\text{Res}(A, A'_X{}^2 B + B'_X{}^2)$ est $2m(4m - 2)$. Finalement celui de $\Delta(A, B)$ est $2m(4m - 2) - 2m = 2m(4m - 2)$. Si on revient au calcul de l'exposant e , on trouve en conclusion

$$e = \begin{cases} 4m - 2 & \text{si } m \text{ impair} \\ 8m - 4 & \text{si } m \text{ pair} \end{cases}$$

ce qui est le résultat annoncé. $\square$

Remarque 5.3.

Si $g = 1$, le fait que $\mathcal{M}_{1,1} \neq \mathcal{H}_1$ (Remarque 4.5), et le fait que ces deux champs ont un groupe de Picard identique, admet une explication simple. On peut aussi déduire du théorème 5.2 le résultat fameux $\text{Pic}(\mathcal{M}_{1,1}) = \frac{\mathbb{Z}}{12\mathbb{Z}}$. Pour que les choses soient claires, on notera que le champ $\mathcal{M}_{1,1}$, à la différence de $\mathcal{H}_1$, n'est pas un champ quotient [BCK]. Ceci étant il n'est pas difficile de voir que $\psi^* : \text{Pic}(\mathcal{H}_1) \rightarrow \text{Pic}(\mathcal{M}_{1,1})$ est un isomorphisme. Cela résulte par exemple de l'interprétation de ψ , donnée dans la remarque 4.5. En effet, X ayant la signification des sections 3 et 4, et donc fournissant un atlas $X \rightarrow \mathcal{H}_1$, on a remarqué (loc.cit.) que le carré suivant est 2-cartésien:

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{M}_{1,1} & \xrightarrow{\psi} & \mathcal{H}_{1,1} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{F} & \xrightarrow{\pi} & X \end{array}$$

Ainsi un faisceau inversible sur $\mathcal{M}_{1,1}$ est incarné par un faisceau inversible sur $\mathcal{F}$. Si $\mathcal{F}' = \mathcal{F} \times_{\mathcal{X}} \mathcal{F}$, il est facile de voir que ce faisceau inversible se trouve être muni d'une donnée de descente relativement à ψ . On utilise pour cela la translation qui relie les deux sections au dessus de $\mathcal{F}'$. Ainsi il provient d'un unique faisceau inversible sur $\mathcal{H}_1$. $\diamond$

Revenons au cas général. Nous allons identifier dans $\text{Pic}(\mathcal{H}_g) = \frac{\mathbb{Z}}{e\mathbb{Z}}$ (e étant comme dans le théorème 5.2) les deux classes naturelles

$$\lambda = c_1(\mathbb{E}) = \det(Rp_!(\omega_{C/S})) \tag{5.6}$$

le déterminant du fibré de Hodge [AV], [BR] et la classe du diviseur $\mathcal{H}_g(2, 1, \dots, 1)$ paramétrant les courbes non ordinaires. On notera $[\mathcal{H}_g(2, 1, \dots, 1)]$ cette classe.

Proposition 5.4. *Dans $\text{Pic}(\mathcal{H}_g) = \frac{\mathbb{Z}}{e\mathbb{Z}}$ avec $e = 4m - 2$ si m impair, sinon $e = 8m - 4$, on a :*

1. $\lambda = \begin{cases} \frac{m-1}{2} & \text{si } m \text{ impair} \\ m-1 & \text{si } m \text{ pair} \end{cases}$
2. $[\mathcal{H}_g(2, 1, \dots, 1)] = 2\lambda$.

En particulier λ est générateur si m est pair, ou bien $m \equiv 3 \pmod{4}$.

Proof. (1) Soit $p : C \rightarrow S$ une courbe hyperelliptique de base S , $q : D \rightarrow S$ le fibré en coniques quotient de C par l'involution τ , et $\pi : C \rightarrow D$ le revêtement de degré deux correspondant. Le faisceau inversible $\lambda \in \text{Pic}(\mathcal{H}_g)$ est défini par

$$\lambda(C \rightarrow S) = \det(Rp_!(\omega_{C/S})) = \det(p_*(\omega_{C/S}))$$

vu que $R^1p_*(\omega_{C/S}) = \mathcal{O}_S$. Si $R \subset C$ est le diviseur de ramification relatif, la formule de ramification donne

$$\omega_{C/S} = \pi^*(\omega_{D/S}) \otimes \mathcal{O}(R) \quad (5.7)$$

Par ailleurs on sait que $R = F$, le diviseur des points fixes de l'involution hyperelliptique τ , et que $\mathcal{O}(R) = \pi^*(\mathcal{L}^{-1})$ (Lemme 3.3). Donc finalement

$$\lambda(C \rightarrow S) = \det(q_*\pi_*(\pi^*(\omega_{D/S} \otimes \mathcal{L}^{-1})))$$

ce qui, par la formule d'adjonction, et la suite exacte (3.2), conduit à

$$\lambda(C \rightarrow S) = \det Rp_*(\omega_{C/S}) = \det q_*(\omega_{D/S} \otimes \mathcal{L}^{-1})$$

Pour identifier ce faisceau inversible, on se place sur l'atlas X décrit dans la section 3, alors $D = \mathbb{P}^1 \times X$ et $\mathcal{L} = \mathcal{O}(-m)$. L'expression (5.6) définit un module libre de rang un sur $k[X]$, équipé d'une action de G , donc définie par un caractère de G . Ce caractère est facile à expliciter¹⁴. Il faut pour cela préciser la G -linéarisation supportée par $\omega_{D/S} \otimes \mathcal{L}^{-1}$. C'est le produit tensoriel d'une part de la G -linéarisation de $\omega_{D/X} = \mathcal{O}_D(-2)$ qui provient de celle canonique, sous $\mathbf{PGL}(1)$, donc avec les notations de la section 3, décrite par $g \in \mathbf{GL}(2) \mapsto \det(g)\alpha_g^{\otimes(-2)}$. Pour le second facteur $\mathcal{L}^{-1}$, la G -linéarisation est donnée par $g \in \mathbf{GL}(2) \mapsto \alpha_g^{\otimes m}$. En conclusion, on trouve que la G -linéarisation de $\omega_{D/X} \otimes \mathcal{L}^{-\infty}$ est définie par

$$g \in \mathbf{GL}(2) \mapsto \det g \alpha_g^{\otimes(m-2)}$$

¹⁴On peut de manière plus générale décrire le fibré de Hodge $\mathbb{E}$. Il correspond au $(k[X], G)$ -module libre de rang g , $\Gamma(\mathbb{P}^1_X, \omega_{\mathbb{P}^1_X} \otimes \mathcal{O}(m))$. Le résultat est le module libre $\mathcal{O}(X)[X, Y]_{m-2}$ des formes de degré $m-2$ à coefficients dans l'anneau des fonctions $\mathcal{O}(X)$. Ce module est muni de l'action de G , $g.F = \det(g)F.g^{-1}$ qui découle de la linéarisation produit tensoriel.

En particulier la matrice diagonale $\mu 1_2$ agit par le facteur $\mu^{m(m-1)}$; en comparant au générateur ψ (Théorème 5.2), le résultat (1) en découle.

(2) Le discriminant $\Delta_m(A)$ d'une forme binaire A de degré m , étant défini par

$$\text{Res}_{m,m-1}(A, A'_X) = a_0 \Delta_m(A)$$

L'équation du diviseur $\mathcal{H}(2, 1 \cdots, 1)$ est, au niveau de l'atlas X donnée par $\Delta_m(A) = 0$. Le discriminant est une forme de degré $2m - 2$ en les a_i , de sorte que relativement au sous-groupe à un paramètre $\mu \mapsto \mu.1_2$, son poids est $m(2m - 2)$. Le résultat en découle du fait du théorème 4.2. $\square$

Remarque 5.5.

Le résultat explicite de dessus montre que $\lambda = c_1(\mathbb{E})$ engendre le groupe cyclique $\text{Pic}(\mathcal{H}_g)$ si et seulement si m est pair, ou bien $m \equiv 3 \pmod{4}$; sinon λ est d'ordre deux. C'est le cas si $g = 2$. Si $g = 2$, et en caractéristique $\neq 2, 3$, Vistoli [V] a montré que l'anneau de Chow de $\mathcal{H}_2$ sur $\mathbb{Z}$ est décrit par

$$A(\mathcal{H}_2) = \mathbb{Z}[\lambda_1, \lambda_2] / (10\lambda_1, 2\lambda_1^2 - 24\lambda_2)$$

où $\lambda_i = c_i(\mathbb{E})$, $i = 1, 2$. Il serait intéressant d'étendre cette description au cas $p = 2$.

On peut se demander si la propriété de lissité subsiste en les points du bord de la compactification stable $\overline{\mathcal{H}}_g$. Rappelons qu'une courbe hyperelliptique de genre $g \geq 2$ stable est donnée par une courbe stable C de genre g , munie d'une involution τ telle que C/τ soit de genre zéro, cette involution est alors unique. Dans ce contexte, le problème propre à la caractéristique deux, vient du fait qu'on ne peut éliminer l'éventualité de points génériques de composantes, des $\mathbb{P}^1$, fixés par τ . Cela apparaît en codimension ≥ 2 . En ces points l'anneau de déformation universelle n'est pas lisse. Il serait utile dans ce cas de préciser la nature des obstructions à la déformation des courbes hyperelliptiques stables, c'est à dire décrire les équations qui définissent l'anneau de la déformation universelle. Ce problème avec des réponses partielles est abordé dans [BMG]. $\diamond$

References

- [AV] A. Arsie, A. Vistoli, *Stacks of cyclic covers of projective spaces*, arXiv:math.AG/0301008
- [BMG] J. Bertin, S. Maugeais, *Déformations des revêtements stables et ramification sauvage*, prépublication
- [BM] J. Bertin, A. Mézard, *Déformations formelles des revêtements sauvagement ramifiés de courbes algébriques*, Invent.math, **41**, (2000), 195-238

- [BR] J. Bertin, M. Romagny, *Champs de Hurwitz*, manuscript
- [BCK] A. Bertram, H. Clemens, ..., A. Kresh, *Stack theory and applications*, Course, Park city Institute, (2001)
- [DG] M. Demazure, P. Gabriel, *Groupes Algébriques*, **Masson**, (1970)
- [GKZ] I.M. Gelfand, M.M. Kapranov, A.V. Zelevinsky, *Discriminants, Resultants and Multidimensional Determinants* **Birkhauser Verlag** 1994
- [I] J.I. Igusa *Arithmetic moduli in genus two*, Annals of math. **72**, (1960), 612-649
- [KL] S. Kleiman, K. Lonsted, *Basics on families of hyperelliptic curves* Compos. Math. **38**, (1979), 83-111
- [LM] G. Laumon, L. Moret-Bailly, *Champs Algébriques*, **Springer-verlag**, (2000)
- [M] D. Mumford, *On Picard groups of moduli problems* Arithmetical Algebraic Geometry (Proc.Conf.Purdue Univ), (1965), 33-81
- [R] M. Raynaud, *Mauvaise réduction des courbes et p -rang*, C.R.Acad.Sc **319**, Série I, (1994), 1279-1282
- [RO] M. Romagny, *thèse (Grenoble)*, Novembre 2002
- [S] J.P. Serre, *Corps locaux* **Hermann**, (1968)
- [SI] J.H. Silverman, *The Arithmetic of Elliptic curves*, Graduate texts in Math. (Springer-Verlag), **106**, (1986)
- [V] A.Vistoli, *The chow ring of M_2* (Appendix to equivariant intersection theory by D.Edidin, W.Graham, Invent.math. **131**, (1998)